

## 三豊市での高病原性鳥インフルエンザの発生に伴う野鳥調査の結果について

三豊市の家きんにおける高病原性鳥インフルエンザの発生を受けて、11月12日から14日にかけて実施した野鳥調査の結果についてお知らせします。

### 記

#### 1 調査結果

野鳥監視重点区域内において、渡り鳥が多く飛来するため池15箇所において、生息状況調査、死亡野鳥調査等を実施した結果、死亡個体の発見等の異常は確認されませんでした。

#### (参考) 野鳥調査で観察された鳥類

区分	種数	具体的な種名
検査優先種1	6種	オシドリ、ヒドリガモ、キンクロハジロ、カイツブリ、カンムリカイツブリ、オオタカ
検査優先種2	5種	マガモ、ホシハジロ、オナガガモ、オオバン、ノスリ
検査優先種3	10種	カワウ、アオサギ、カルガモ、ハシビロガモ、コガモ、オカヨシガモ、ハジロカイツブリ、トビ、ミサゴ、ハイタカ
計	21種	

※ 検査優先種とは、香川県高病原性鳥インフルエンザ対応マニュアル（野鳥編）において感染して死亡しやすい種を中心に設定（裏面）

#### 2 今後の対応

- ・引き続き、野鳥監視重点区域において、野鳥の監視を継続します。

## 検査優先種

検査優先種1(17種) 目的:早期発見のため		* 高病原性鳥インフルエンザ(H5 亜型)に感受性が高く、平成22~28年の発生時を合わせた感染確認率が5%以上であった種。	
目・科	種	目・科	種
カモ目カモ科	シジュウカラガン	カツブリ目	カツブリ
	マガン	カツブリ科	カンムリカツブリ
	ヒシクイ	ツル目ツル科	ナベヅル
	コブハクチョウ(※1)		マナヅル
	コクチョウ	チドリ目カモメ科	ユリカモメ
	オオハクチョウ	タカ目タカ科	オオタカ
	コハクチョウ	ハヤブサ目ハヤブサ科	ハヤブサ
	オシドリ		
	ヒドリガモ		
	キンクロハジロ		
重度の神経症状が観察された水鳥類(※2)			
検査優先種2(11種) 目的:さらに発見の可能性を高めるため		* 過去に日本と韓国等において死亡野鳥で感染確認のある種を含める。	
目・科	種	目・科	種
カモ目カモ科	マガモ	タカ目タカ科	オジロワシ
	オナガガモ		オオワシ
	ホシハジロ		ノスリ
	スズガモ		クマタカ
	トモエガモ	フクロウ目フクロウ科	フクロウ
ツル目クイナ科	オオバン		

  

検査優先種3 目的:感染の広がりを把握するため		* 水辺で生息する鳥類としてカワウやアオサギ、検査優先種1あるいは2に含まれないカモ科、カツブリ科、ツル科、カモメ科の種を、また鳥類を捕食する種として検査優先種1あるいは2に含まれないタカ目、フクロウ目、ハヤブサ目の種を対象とした。	
目・科	種	目・科	種
カツオドリ目ウ科	カワウ	チドリ目カモメ科	上記以外全種 (セグロカモメ、ウミネコ等)
ペリカン目サギ科	アオサギ	タカ目タカ科	上記以外全種 (トリ等)
ツル目ツル科	上記以外全種 (タツノウサギ等)	フクロウ目フクロウ科	上記以外全種 (コミズク等)
カモ目カモ科	上記以外全種 (カツオドリ、コガモ等)	ハヤブサ目ハヤブサ科	上記以外全種 (ショウジョウボウウ等)
カツブリ目 カツブリ科	上記以外全種 (ハシブリ、カツブリ等)		

  

その他の種
上記以外の鳥種全て

※1外来種

※2 重度の神経症状とは、首を傾けてふらついたり、首をのけぞらせて立っていられなくなるような状態で、正常に飛翔したり、採食したりすることができない状態をいう。