

水稻作況試験情報 【令和7年産 早期コシヒカリ】

香川県農業試験場（5月31日現在）

移植後の気温は、5月4半旬及び5月5半旬の最低気温は高かったが、平年並みからやや低い範囲で推移した。降水量は5月2半旬がやや多かった。日照時間は5月1、3半旬が多照であった。田植30日後の調査では、過去5か年平均に比べ草丈は同等であり、茎数、主稈葉数はやや多かった。

1. 作況試験の方法


- 1) 供試品種：コシヒカリ
- 2) 播種期：4月10日 移植期：5月1日
- 3) 育苗方法：播種後、加温出芽させた後、ハウス内で緑化、硬化させた。
- 4) 栽植密度及び移植方法
18.5 株/m² (30 cm×18 cm)、1 株 4 本程度、機械移植
なお、生育調査株は移植後 1 株 4 本に調整した。
- 5) 本田施肥 (N成分kg/a)

	基肥	穂肥Ⅰ(予定)	穂肥Ⅱ(予定)
コシヒカリ	0.35	0.15	0.1

- 6) 使用肥料：化成肥料 (N : P₂O₅ : K₂O = 14 : 10 : 12%)

2. 具体的データ

令和7年産水稻 気象表（播種～5月6半旬まで）



令和7年産 水稻作況試験生育調査結果(5月31日現在)

調 査 (月／日)	供試品種 項 目	早期コシヒカリ		
		本年	過去5か年平均値	差(比)
田植時 (5/1)	草丈(cm)	13.0	14.6	▲ 1.6
	主稈葉数(枚)	2.1	2.1	0.0
田植20日後 (5/21)	草丈(cm)	24.0	26.6	▲ 2.6
	茎数(本/㎡)	152	144	6 %
	主稈葉数(枚)	5.6	5.0	0.6
田植30日後 (5/31)	草丈(cm)	30.0	30.6	▲ 0.6
	茎数(本/㎡)	340	314	8 %
	主稈葉数(枚)	7.4	6.9	0.5
田植40日後 (6/10)	草丈(cm)		42.7	
	茎数(本/㎡)		573	%
	主稈葉数(枚)		8.5	
田植50日後 (6/20)	草丈(cm)		60.7	
	茎数(本/㎡)		631	%
	主稈葉数(枚)		9.7	
田植期(月／日)		5/1	5/1	0
幼穂形成始期(月／日)			6/23	
出穂期(月／日)			7/14	
主稈止葉葉数(枚)			12.2	
稈長(cm)			89.1	
穂長(cm)			20.8	
穂数(本/㎡)			410	%
成熟期(月／日)			8/16	

注1) 差(比)は、過去5か年平均値との比較で示した。なお、茎数については対比(増減%)で表し、これ以外の項目については対差(実数値)で表した。なお▲は少ない、短い、早いことを示す。