


1. 屋島湾の海水温 (午前9時)



2月12日の屋島湾の海水温は 7.4℃で、昨年度より 2.3℃低く、平年値より0.9℃低くなっています。

2. 摘採の状況

海水温は、先週からの寒波の影響により急激に低下し、平年値より低く推移しています。県下の摘採は5～6回目が中心で、早い漁場で7回目に入っています。全体的に伸びはまずまずですが、色艶がやや浅くなっており、色落ちが進行している漁場も見られます。

東讃: 5回目の摘採が中心。庵治は7回目を摘採中。全体的に伸び、色艶ともにまずまず。

高松: 5～6回目の摘採が中心。全体的に伸びはまずまずだが、色艶はやや浅くなっている。

小豆: 6～7回目の摘採が中心。大部、北浦、内海は7回目を摘採中。全体的に伸びはまずまずだが、色艶はやや浅くなっている

中讃: 2～4回目を摘採中。全体的に伸びがやや鈍く、色艶もやや浅くなっている。

3. 栄養塩及びプランクトン

採水日:令和7年2月12日

① 栄 養 塩

(分析機関:香川県水産試験場、単位: $\mu\text{g at}/\ell$)

漁 場		三 態 窒 素										
		12/10	12/17	12/27	1/7	1/14	1/21	1/28	2/4	2/12	2/18	2/25
引 田	本 年 度	3.7	4.0	2.4	2.6	2.6	1.4	0.5	2.4	0.8		
	前 年 度	1.7	1.3	2.3	1.6	0.5	0.5	0.4	0.7	0.6	0.8	0.4
東 讃	本 年 度	4.4	2.2	1.2	2.0	1.1	1.9	0.4	1.7	0.1		
	前 年 度	1.9	1.2	1.9	0.3	0.3	0.1	0.1	1.3	0.2	0.3	0.1
津 田	本 年 度	6.1	3.7	1.4	2.4	1.8	2.0	2.2	欠測	0.3		
	前 年 度	欠測	0.8	1.1	0.3	0.2	0.1	欠測	0.6	0.2	3.2	24.8
志 度 湾	本 年 度	4.2	3.1	0.4	2.1	1.9	2.2	1.6	1.0	0.5		
	前 年 度	1.5	0.9	1.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.3	0.2	0.1	0.3
庵 治	本 年 度	3.8	3.0	0.7	2.0	2.5	2.6	2.9	1.3	0.8		
	前 年 度	1.5	0.9	1.3	0.6	0.4	0.2	0.1	0.6	0.2	0.6	欠測
瀬 戸 内	本 年 度	3.3	3.1	1.9	2.2	3.0	2.3	1.6	1.0	0.4		
	前 年 度	0.7	0.5	2.2	0.7	0.3	1.3	0.5	1.3	0.6	1.4	2.6
香 西	本 年 度	3.1	2.7	1.8	2.0	2.5	3.4	2.1	1.4	0.1		
	前 年 度	1.1	2.0	2.0	0.6	0.3	1.0	0.3	1.8	3.2	1.3	1.5
下 笠 居	本 年 度	2.4	1.7	1.2	2.1	2.2	2.0	0.8	0.5	0.0		
	前 年 度	0.3	0.5	1.3	0.0	0.1	0.2	0.6	0.7	0.0	0.4	1.2
直 島	本 年 度	3.5	3.1	1.6	2.7	1.7	4.8	1.1	0.6	0.3		
	前 年 度	0.8	2.4	1.3	0.6	0.9	1.1	0.9	2.5	0.6	0.9	1.7
土 庄	本 年 度	3.8	3.0	0.7	3.3	欠測	3.2	1.2	0.4	0.1		
	前 年 度	0.1	0.4	0.8	0.2	0.1	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.2
四 海	本 年 度	5.0	3.5	1.3	2.0	2.0	2.2	1.5	0.4	0.4		
	前 年 度	0.4	0.4	0.9	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	欠測	欠測	0.4
唐 櫃	本 年 度	3.3	2.3	0.9	1.5	1.4	1.9	0.7	0.3	1.1		
	前 年 度	0.1	0.8	1.9	0.9	0.3	欠測	0.5	0.0	0.1	0.3	0.9
北 浦	本 年 度	4.8	3.0	1.8	1.6	1.5	2.2	1.2	0.4	0.1		
	前 年 度	1.1	0.6	1.1	0.2	0.2	0.7	0.1	0.1	0.0	0.0	0.3
大 部	本 年 度	4.5	3.4	1.1	4.4	2.9	2.0	1.3	0.9	2.7		
	前 年 度	1.2	0.6	1.4	0.0	0.2	1.2	0.1	0.2	0.4	欠測	0.9
内 海	本 年 度	4.4	3.9	2.0	3.1	2.3	1.9	2.2	1.1	1.4		
	前 年 度	1.9	0.5	1.8	0.7	0.2	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.1
与 島	本 年 度	3.4	3.5	2.0	4.3	3.9	0.6	1.3	1.9	1.7		
	前 年 度	3.0	1.4	5.0	0.7	0.2	3.6	0.9	2.9	0.8	3.3	1.6
丸 亀 市	本 年 度	2.3	0.5	2.3	1.4	2.4	0.7	0.0	0.4	0.2		
	前 年 度	0.4	欠測	0.7	1.8	0.1	0.7	0.9	1.8	0.5	0.1	2.4
箱 浦	本 年 度	1.5	0.6	1.6	1.1	1.3	0.2	0.0	0.1	0.0		
	前 年 度	0.1	0.8	1.0	0.1	1.0	1.5	0.9	0.3	0.9	3.1	0.2
平 均	本 年 度	3.8	2.8	1.5	2.4	2.2	2.1	1.3	0.9	0.6	0.0	0.0
	前 年 度	1.0	0.9	1.6	0.5	0.3	0.7	0.4	0.9	0.5	1.0	2.3

※三態窒素：アンモニア・硝酸・亜硝酸態窒素の合計で、 $3\mu\text{g at}/\ell$ 以下になると色落ちの原因となる。

(調査結果)

本年度第17回目の栄養塩調査を実施しました。調査結果は、 $0.0\sim 2.7\mu\text{g at}/\ell$ 。全漁場における平均は $0.6\mu\text{g at}/\ell$ で、前年度($0.5\mu\text{g at}/\ell$)と同程度となっています。

② 植物プランクトン

(分析機関：香川県赤潮研究所、 単位：個/ℓ)

漁 場	植 物 プ ラ ン ク ト ン 数						備 考	
	コ シ ノ デ ィ ス カ ス				ユ ー カ ン ピ ア		珪藻優占種第1位	
	2月12日		前年同時期		2月12日	前年同時期		
	ワレシ-	全数	ワレシ-	全数				
引 田	0	0	50	350	0	19,400	キートセロス	10,500
東 讃	0	0	0	150	0	1,850	リゾソレニア	3,250
津 田	0	0	0	0	0	1,050	グイナルディア	4,500
志 度 湾	0	0	0	150	0	1,750	グイナルディア	15,500
庵 治	0	0	0	100	0	0	リゾソレニア	4,250
高松市瀬戸内	0	0	0	350	0	0	グイナルディア	7,500
香 西	0	0	0	50	0	2,150	グイナルディア	18,250
下 笠 居	0	0	0	50	0	0	グイナルディア	27,500
直 島	0	50	0	350	0	1,150	グイナルディア	15,500
土 庄	0	0	50	900	0	5,200	グイナルディア	4,800
四 海	0	100	欠測	欠測	0	欠測	リゾソレニア	3,550
唐 櫃	0	50	0	50	0	0	リゾソレニア	11,500
北 浦	0	0	0	50	0	800	リゾソレニア	6,500
大 部	0	0	0	0	0	0	リゾソレニア	1,000
内 海	0	0	0	150	0	2,200	リゾソレニア	6,000
与 島	0	0	0	0	0	0	グイナルディア	46,500
丸 亀 市	0	0	0	50	0	0	グイナルディア	24,000
箱 浦	0	0	0	50	350	0	グイナルディア	12,500

(調査結果)

i) コシノディスカス ワイレシー
全漁場で検出されていません。

ii) ユーカンピア
箱浦の350個/ℓ、1漁場でのみ検出されています。

iii) 珪藻優占種
グイナルディア、リゾソレニアが主に優占して出現しています。

※ 次回調査は、2月18日(火)に予定します。

ノリ養殖漁場栄養塩調査結果 第17回(令和7年2月12日)

